

Dott. Nikolaos Papadopoulos

Medico – Chirurgo

Specialista in Ginecologia e Ostetricia

ESAMI IN GRAVIDANZA

Entro la 13^a settimana, e comunque al primo controllo:

- GRUPPO SANGUIGNO + Test di Coombs Indiretto (in caso di Rh negativo il test deve essere ripetuto a 28 settimane)
- EMOCROMO
- GLICEMIA
- VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (in caso di IgG negative, ripetere ogni 5 settimane fino la 17^a sett.)
- TOXOPLASMA ANTICORPI (in caso di IgG negative ripetere ogni 5 settimane fino al parto)
- TPHA / VDRL
- HIV 1-2 ANTICORPI
- **ALT - AST
- ESAME URINE*

Tra la 14^a e la 18^a settimana:

- **ESAME URINE*
- **URINOCOLTURA

Tra la 19^a e la 23^a settimana:

- **ESAME URINE*

Tra la 24^a e 27^a settimana:

- **GLICEMIA
- Curva da carico di glucosio 75g
- ESAME URINE*
- Test di Coombs Indiretto per le pazienti Rh negative

Tra la 28^a e la 32^a settimana:

- EMOCROMO (in caso di Hb < 10,5 si consiglia terapia marziale)
- FERRITINA (in caso di riduzione del volume globulare medio)
- ESAME URINE*
- Possibile Immunoprofilassi anti-D in caso di Rh negativo
- Vaccinazione per Pertosse

Tra la 33^a e la 37^a settimana

- ESAME URINE*
- Eventuale EMOCROMO se ↓Hb
- HBsAg,
- **HCVAb
- HIV 1-2
- Tampone Vaginale/Rettale per la ricerca GBS

Tra la 38^a e la 40^a settimana

- ESAME URINE* (da ripetere ogni settimana)
- Monitoraggio della pressione 2 volte la settimana

(*) In caso di batteriuria significativa : URINOCOLTURA

(**) esami soggetti a pagamento ticket

Codice per esenzione della gravidanza : 4 + settimana di gestazione (p.es 415, gravida a 15settimane) o 450 se gravida a rischio